

Igényeim:	
Fény	<p>Félárnyékos helyeket kedvelem, még az árnyékot is elviselem</p> <p>Ültethetsz napra, ám itt biztosítsd a rendszeres és ki-elégítő vízellátásom</p>
Víz	<p>Páraigényes, közepesen vízigényes dísznövény vagyok, kánikulában igénylem az öntözést</p>
Hőmérséklet	<p>Télen, fiatalabb koromban igényelek némi árnyékvédelmet, mert leveleim a nagy hidegtől és az előforduló erős napsütéstől károsodhatnak</p>
Talaj	<p>Talajban nem válogatok, viszont inkább az enyhén savanyú talajokat részesítem előnyben</p>
Egyéb	<p>Kertépítészeti értékemet tekintve elsőrendű dísznövény vagyok, mind a négy évszakban csodálható</p> <p>Alkalmazásomnál vedd figyelembe, hogy a minden részem gyengén mérgező, tehát bölcsődék, óvodák és általános iskolák kertjébe használatom nem ajánlott</p>

Felhasználásom:

Szoliter	Közepes vagy nagyméretű kertekben
Háttérnövény	Nagyobb terekben, csoportosan telepítve
Sövény	Nagyobb kertekben, parkokban nyírás nélkül alkalmas vagyok sövénynek
Nyírott sövény	<p>A nyírást viszonylag jól viselem, ezért nyírott sövényként is használhatsz, ebben az esetben az ajánlott ültetési távolságom nagyobb termetem okán 0,8-1,0 méter</p> <p>Embermagasságú vagy annál is magasabb méretű sövény létesítéséhez tökéletes választás vagyok</p>

Betegségek, kártevők:

Kielégítő körülmények között betegségekkel és kártevőkkel szemben minden fajtam ellenálló, ám túllöntözött, túl párás körülmények hatására levelem lyukacsosodhat:



⇒Levélylukacsosodás (*Stigmia carpophila*)

Esős tavaszokon támad, tünete kicsi barna foltok, majd lyukak. Ez a kórokozó nem érzékeny a környezeti hatásokra, jól viseli a hideget és a meleget is. Előfordul, hogy enyhébb teleken is támad! Fertőzőképességét 1-2 évig megőrzi. A fertőzés kezdetén apró kör alakú foltok jelennek meg, amik eleinte sárgák, majd megbarnulnak, aztán a levelem átlukad. A gomba a rügyeimet is támadhatja, a behatolás helyén ilyenkor mézgacsepp látható.

⇔Védekezés:

Természetesen az ültetési helyem alapos **megválasztása**, tavasszal a túlzott öntözést kerüld, támadás jelentkezésekor a fertőzött leveleim, rügyeim távolítsd el, égesd el. A gomba a lehullott levél- és ágrészeimen telel, ezért azok összegyűjtését és elégetését is erősen **ajánlom!**

⇔Vegyszeres védekezéshez megfelelő szerek:

MERPAN 80 WDG, CHAMPION 50 WP

Az őszi, és a kora tavaszi lemosó permetezés javasolt szere a NEVIKÉN, melynek gombaölő hatása is jó