

Igényeim	
Fény	<p>Leginkább a napos helyekett kedvelem.</p> <p>A félárnyékban még kielégítően fejlődök, ilyen helyeken valamivel kevesebb virágot, ritkásabb ágrendszert produkálok.</p>
Víz	<p>Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok, a szárazságot jól viselem.</p>
Hőmérséklet	<p>Mediterrán származásom ellenére, a magyarországi hőmérsékleti és egyéb klimatikus viszonyokat bírom.</p>
Talaj	<p>Jó minőségű, tápanyagban gazdag talajt meghálálom, ám nem igénylem, kevésbé jó minőségű talajokon is jól fejlődök.</p>
Egyéb	<p>Egyedi, rózsaszín és piros, telt virágaim tömegesen, egész nyáron hozom, melyek különösen szép hatásúak, színes foltok kialakítására kiválóan megfelelek.</p>

Felhasználásom

Talajtakaró	Száraz területeken, sűrűn ültetve jól funkcionálok, ha így szeretnél használni, akkor 1 m ² -re kettő-négy példányomat ültess.
Rézsűk	Rézsűkön is használhatsz, sűrű növekedéssel, ezáltal sűrű gyökérszettel a rézsűket jól megfogom.
Balkon	Edényben tartva, kicsit gondosabban locsolva remekül mutatok, különösen virágzáskor.

Betegségeim, kártevőim

Rózsalisztharmat (*Sphaerotheca pannosa* var. *ro- sae*)



Gombabetegség, kézzel könnyen letörölhető fehér bevonat, mely leveleken és virágbimbóimon is megjelenhet.

⇒Védekezés

A fertőzött részeit meg kell semmisítened!

⇒Vegyszeres védekezés

A fertőzés elhatalmasodását észlelve **Amistar** vagy **Topas 100 EC** használata permetezőszereként.

Rózsarozsda (*Phragmidium mucronatum*)



Gombabetegség, leggyakrabban ősz elején támad, a leveleken foltok jelentkeznek, majd a levélfonákon megjelennek a narancsszínű

	<p>gombaképletek is. Esztétikailag elcsúnyít, ám lombhulláshoz is vezethet, és a vesszőimet is megtámadhatja, ezeket metszéssel el kell távolítanod és meg kell semmisítened.</p> <p>⇒Védekezés</p> <p>Megjelenéskor a fertőzött leveleimet el kell távolítanod.</p> <p>⇒Vegyszeres védekezés</p> <p>Amennyiben a fertőzés nem szűnik, ajánlott az Amistar permetezőszert használnod.</p>
<p>Rózsalevéltetű (Macrosiphum rosae)</p>	 <p>A zöld rózsalevéltetvek, a fiatal, még lágy hajtásaimat támadják meg, az általuk kiválasztott, ragadós, cukorban gazdag, viasszá szilárduló nedv, a mézharmat, jó táptalajt jelent az itt megtelepedő, a virágbimbóimat, leveleimet feketére szennyező korompenésznek, amely díszítő értéket jelentősen csökkenti. A rózsalevéltetvek jelenlétét a korompenész megjelenése mellett a hangyák feltűnése is egyértelműen jelzi.</p> <p>⇒Védekezés</p> <p>Nagyban segít a megfelelő tápanyag- és vízellátásom biztosítása, mert a egészségesebb és ellenállóbb leszek ezáltal.</p>

⇒Vegyszeres védekezés

Alkalmas lehet a **Decis 2,5 EC**, a **Zolone**, a **Mospilan 20 SP**, a **Karate 2,5 WG** vagy a **Vektafid** rovarölő szerek valamelyike, lehetőleg az inváziót észlelve azonnal szükséges permetezned, javasolt szer még az **Actara 25 WG**.

Általános védekezéshez segítségül ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt olajos lemosópermetezést alkalmaznod, ehhez a Mészkénlé, a Nevikén és a Novenda lemosópermetezőszerek valamelyike használható.