

Igényeim:

Fény	Fényigényes dísnövény vagyok
Víz	Mezofita, azaz közepes a vízigényem a szárazságot nehezen viselem
Hőmérséklet	A Magyarországi klímát jól viselem, minden normál díszkerti körülmény közé ültethetsz
Talaj	Talajban nem válogatok, a meszes talajokra érzékeny vagyok, ilyen körülmények között levelem sárgulni kezd
Egyéb	Változatos virágdísszel gyönyörködtetek, a fehértől a tűzpirosig, fajtától függően

Felhasználásom:

Szoliter	<p>Csak olyan helyen, ahol nem zavarnak szúrós vesszőim</p> <p>Korai virágdíszem tavasszal, őszi termékdíszem pedig télig jelentős</p>
Sövény, Virágzó sövény	<p>Sövényként is telepíthetsz, a nyírást csak kissé viselem, ám nyírás nélkül is megfelelő takarást és védelmet eredményezek</p>

Betegségeim, kártevőim:

Kissé kényes dísznövény vagyok, így betegségek, kártevők támadhatnak, különösen, ha nem megfelelő számomra a telepítés helye

- **Első és legfontosabb védekezés tehát, az igényeimnek megfelelő körülmények biztosítása**, ezeknek általában a normál díszkerti viszonyok eleget tesznek



⇒Gombás fekete foltosodás (Spilóceás foltosság)

Tavasszal esős, nedves körülmények idején jelentkezik, támadja a leveleim, melynek hatására hamar le is hullnak

⇔Védekezés:

A lehullott fekete foltos levelek által a gombabetegség tovább terjedhet, így veszélyes a még egészséges lombra, vagy a többi még nem fertőzött egyedre

Ajánlatos a lehullott leveleket összegyűjteni és elégetni!

⇔Vegyszeres védekezés:

Permetezés szükséges, melyhez javasolt gombaölő szerek: **Kocide, Dithane, Chorus, Topas**. (A permetezés terjedjen ki a lehullott levelekre is, amennyiben nem semmisítetted meg azokat!)



⇒**Tűzelhalás (Erwinia amylovora)** is fenyeget

⇔**Védekezés:**

veszélyes kártevő, mely ellen még nem olyan régen a kivágás, és megsemmisítés volt az egyetlen eljárás, ám mára **hatásos** védekezés lehet a bakteriofágok használata. Ilyen az **ERWIPHAGE** készítmény, melyet napjainkban (**2013**) vezetnek be hazánkban



⇒**Levéltetű (Aphididae)**

Nem megfelelő (nem mezofita) körülmények, azaz **száraz viszonyok között legyengülök, levéltetvek lephetik el** az új hajtásaim, ezzel tovább gyengítve vitalitásomat

⇔**Védekezés:**

A sárga szín vonzza a tetveket, ezért hatásos a sárga színű ragadós csapda, amit időben ki lehet tenni és folyamatosan szemmel tartva jelzőműszerként is megfelel, az inváziót előre észlelheted használatával

⇔**Vegyszeres védekezés:**

Rajzáskor már a rovarölő szereket kell alkalmazni
→ ilyen a **Decis 2,5 EC, Karate 2,5 WD, Actara 25 WG**

Mindezen kártevők és betegségek megelőzésekképp, általános védekezéshez segítségül, ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt olajos lemosó-permetezést alkalmazni, az olaj elzárja a kórokozóktól a levegőt, miáltal így azok elpusztulnak

Az **Agrol**, a **Nevikén** és a **Vektafid** permetezőszerek valamelyike használható