

<b>Igényeim</b>	
<b>Fény</b>	Fényigényes díszfa vagyok, a benapozott helyeket kedvelem igazán, de félárnyékban is jól fejlődök.
<b>Víz</b>	Mezofita, azaz közepes vízigényű díszfa vagyok, ám tűrőképes, így kisebb szárazságot is el tudok viselni.
<b>Hőmérséklet</b>	<p>A magyarországi klímát jól tűröm, hideg teleket is jól viselem.</p> <p>A normál díszkerti körülmények tökéletesen megfelelnek számomra.</p>
<b>Talaj</b>	Nedves talajokon érzem magam jól, viszont a talaj minőségére nem vagyok kényes, így szinte bármilyen talajon megélelem.
<b>Egyéb</b>	Tűrőképességem remek, a városi, szennyezett levegőt is jól tűröm.

## Felhasználásom

<b>Parkfa</b>	Kisebb parkok egyedi díszje lehetnek.
<b>Szoliter</b>	Tavaszi virágzásom, és sokáig fán maradó, szép termékdíszem, valamint sárga őszi lombszínem tesz egyedi díszítő értékűvé.
<b>Utcafa</b>	Kisebb városok, szűk terű utcákban használhatók ilyen célra.

## Betegségek, kártevők

A következőkre kell odafigyelni:

### Galagonya-leveltetű (Rhopalosiphum insertum)



Gyakori és **jelentős kártevő**. Hatására a hajtások rendellenesen növekszenek, majd a növekedés teljesen leáll. A keletkező mézharmaton megtelepülő korompenész a dísznövény egészségi és esztétikai értékét is csökkenti. A kártétel **tavaszzal**, lombfakadást követően kezdődik.

#### ⇔Védekezés

Ideális körülményeim biztosítása, a fertőzött lombot össze kell gyűjteni és szükséges megsemmisítened.

#### ⇔Vegyszeres védekezés

Lehetőleg az inváziót észlelve azonnal permetezz! Alkalmas lehet a **Decis 2,5 EC**, a **Zolone**, a **Mospilan 20 Sp**, a **Karate 2,5 WG** vagy a **Vektafid** rovarölő szerek valamelyike.

### Galagonya-takácsatka (Tetranychus viennensis)



A károsított levelek kezdetben az erek mentén, a szívogatás hatására sárgulnak, majd megbarnulnak, és idő-előtt lehullnak. Fonákjukon a takácsatkára jellemző pókhálószerű szövedék látható.

#### ⇒ Vegyszeres védekezés

Az atkákat észlelve ajánlatos **azonnal elkezdni védekezni**. Használható a **Fulmite 200**, a **Sanmite 20 WP** speciális atkaölő szerek valamelyike, ezek hosszú hatástartamú **(40-60 nap)** atkaölő szerek, ezért jól időzítve lehet, hogy elég egy évben egyszer **(április-május)** elvégezni a permetezést, szükség esetén a következő kezeléshez váltott szert használjunk!

Mindezek mellett ajánlott ősszel és kora tavasszal lemosó-permetezésben részesítened, ehhez a **Mézkénlé**, a **Nevikén** és a **Novenda** permetezőszerek valamelyike használható.