

Igényeim	
Fény	Napsütötte, meleg helyet kedvelek. Félárnyékban még jól fejlődök.
Víz	Mezofita, azaz közepes vízigényű dísznövény vagyok, a nyári szárazságot is jól viselem.
Hőmérséklet	A magyarországi klímát jól viselem, mint virágos kőris, mely az alapfajom (Fraxinus ornus), őshonos fafaj vagyok itt.
Talaj	Jó minőségű, üde, tápanyagban gazdag talajt igényelek, de gyengébb minőségű talajon is megfelelően fejlődök.
Egyéb	Gömb lombkorona, kiegyensúlyozott növekedés.

Felhasználásom

Parkfa	Kedvelt felhasználási módomban, ott, ahol a gömb koronaformám megfelelően érvényesül, például sétautak mentén.
Szoliter	Megjelenésem, mely a gömbkoronámat jelenti és májusi, illatos virágzásom tesz egyedi díszítő értékűvé.
Utcafa	Kisebb utcák bensőségesebb terében érvényesülök, közepes termetem, megkapó lombom, behatárolt, nem túl agresszív növekedésem tesz erre alkalmassá.

Betegségeim, kártevőim

Normál díszkerti viszonyok között, jó kondícióban, a kőrisek közül szinte egyedülként, ellenállok a kőriselhalás nevű kórokozónak.

Néha, különösen kedvezőtlen körülmények között, támadhatnak kártevők, ilyen például, a kőrispajzstetű.

Kőrispajzstetű (Pseudochermes fraxini)



A nőtény ovális alakú, 0,5 mm széles és 0,75 mm hosszú, narancsvörös színű. Európában általánosan elterjedt, hazánkban is gyakori. Kőrisfajokon él, de berkenye és orgona fajokról is vannak adatok. Elsősorban erdészeti kártevő, de városi parkok és utcai sorfák is erősen szenvednek a kártételétől. Lárvaalakban telel, évente 1 nemzedéke fejlődik ki. Nagyon gyakori a legyengült (pl. vadkárosított) egyedeken, melyeket aztán nagy tömegben tud ellepni.

⇒Védekezés

Ültetéskor a helyének megfelelő megválasztása, a kőris kielégítő körülményeinek biztosítása, miáltal a díszfa ellenálló-képessége növekszik a pajzstetűvel szemben.

⇒Vegyszeres védekezés

Javasolt szer a **Mospilan 20 SP**, a **Karate 2,5 WG** vagy a **Vektafid** rovarölő szerek valamelyike, lehetőleg az inváziót észlelve azonnali permetezés javasolt!

Megelőzőképp, általános védekezéshez segítségül, ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt olajos lemosó-permetezést alkalmazni, ehhez a **Mézkénlé** és a **Nevikén** permetezőszerek valamelyike használható.