

Igényeim:	
Fény	Napsütötte helyeket kedvelem, a félárnyékot is elviselem
Víz	Mezofita, azaz közepesen vízigényes viszonyok között érzem jól magam, ilyen körülmények között, és be-napozott helyen teljes pompámat produkálom
Hőmérséklet	Normál díszkerti körülmények között tökéletesen érzem magam, a teleket jól viselem
Talaj	Talajban nem válogatok, ám az üde, enyhén meszes talajokat kedvelem. Tápanyagigényem magas
Egyéb	Japánban régóta foglalkoznak a díszcseresznye (Prunus serrulata) nemesítésével, mondhatni kultusza van használatának. Rengeteg fajtája létezik, melyek többsége eredeti japán nevet visel Magyarországon a legkedveltebb fehér virágú vagyok

Felhasználásom:

Szoliter


Közepes vagy nagyobb méretű kertekben

Ilyen méretű kertekben leginkább szoliterként ültessél, és szépségem virágzáskor érvényesül igazán, majd továbbiakban csodálatos koronaformám által díszítek, ősszel pedig aranysárga leveleim növelik díszírtékem

Fiatal koromban koronámon szükséges koronaalakító metszést végezned

Betegségek, kártevők:

Gyakori és jelentős kártevőm a ⇒ **levéltetű**



⇒ **Levéltetű**

(Rhopalosiphum insertum)

Hatására a hajtásaim rendellenesen növekszenek, majd a növekedésem teljesen leáll. A keletkező mézharmaton megtelepülő korompenész egészségi és esztétikai értékemet is csökkenti. A kártétel **tavasszal**, lombfakadásomat követően kezdődik

⇔ **Vegyszeres védekezés:**

Alkalmas lehet a DECIS, a ZOLONE, a CHINETRIN, a MOSPILAN, a KARATE vagy a VEKTAFID S rovarölő szerek valamelyike, lehetőleg az inváziót észlelve azonnal permetezzél

További jelentős kártevőm a ⇒**Takácsatka**



⇒**Takácsatka (Tetranychus viennensis)**

A károsított leveleim kezdetben az erek mentén, a szívogatás hatására sárgulnak, majd megbarnulnak, és idő-előtt lehullnak. Fonákjain a takácsatkára jellemző pókhálószerű szövedéket láthatsz.

⇔**Vegyszeres védekezés:**

Az atkákat észlelve ajánlatos azonnal elkezdni védekezni, használható a FULMITE 200, a SANMITE 20 WP speciális atkaölő szerek valamelyike. Ezek hosszú hatástartamú (40-60 nap) atkaölő szerek, ezért jól időzítve lehet, hogy elég egy évben egyszer (április-május) elvégezni a permetezést. Szükség esetén a következő kezeléshez váltott szert használj

Túllöntözött, nyirkos talajon támadhat a ⇒**gyökérrothadás**



⇒**Gyökérrothadás (Verticillium spp.)**

Gombás betegség, mely a gyökereket károsítja, ezáltal pusztulást okozhat

⇔**Védekezés:**

Ültetéskor helyem **megfelelő** megválasztása, **kielégítő** körülményeim biztosítása. Megfelelő talaj, és a vízáradás helyes alkalmazásával elkerülhető a betegség. Amikor észleled, hogy hervadozok, **csökkentsd** a kijuttatott öntözővíz mennyiségét

⇔**Vegyszeres védekezés:**

Általános védekezéshez segítségül ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt olajos lemosó permetezést alkalmaznod. Ehhez az AGROL, a MÉSZKÉNLE, a NEVIKÉN és a NOVENDA lemosó-permetezőszerek valamelyike használható

Fenyeget a ⇒**tűzelhalás** is

⇒**Tűzelhalás (Erwinia amylovora)**

⇔**Védekezés:**

Veszélyes kártevő, mely ellen még nem olyan régen a kivágás, és megsemmisítés volt az egyetlen eljárás, ám mára hatá-
sos védekezés lehet a bakteriofágok használata. Ilyen az ER-
WIPHAGE készítmény, melyet napjainkban (2013) vezetnek
be Magyarországon