

<b>Igényeim:</b>	
<b>Fény</b>	Félárnyékos, árnyékos helyeket kedvelek, napra is ültethetsz, ám ott a téli hidegekben leveleim egy része megbarnulhat, mely aztán tavasszal gyorsan kizöldül
<b>Víz</b>	Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok  Közepes szárazságot még jól viselem, ám kánikulában jó néven veszem az öntözést!
<b>Hőmérséklet</b>	A magyarországi teleket remekül bírom, különösen igaz ez a nemesített, edzett fajtáimra  Nyári kánikulában igénylek némi öntözést  Néhány levelem télidőben napon elszíneződhet
<b>Talaj</b>	Jó minőségű, laza, tápanyagban gazdag talajokat kedvelek, ám jól viselem a gyengébb minőségű talajokat is
<b>Egyéb</b>	A városi szennyezettebb levegőt jól viselem  Dúsan virágzom és termésem is jelentős, éppúgy a díszértéke is!

## Felhasználásom:

### Szoliter

Örökzöld jellegem, dús virágzásom, jelentős termés mennyiségem alkalmassá tesznek egyedi kerti dísznek, így ültetve számolj jelentős termemmel, ezáltal térigényemmel

### Sövény

Szép, ám szúrós dísznövény vagyok, épp ezért védősövényként használhatsz, a nyesést remekül viselem, így nyírott sövénynek is beválok

## Betegségeim, kártevőim

### Gombás fekete- foltosodás (Spilóceás foltos- ság / *Spelocaea* *pyracanthae*)



Gombabetegség, mely esős, nedves körülmények idején jelentkezik, bogyók mellett támadja a leveleket is, melynek hatására a levelek hamar le is hullanak

⇔**Védekezés:**

Lehullott fekete-foltos levelek által a gombabetegség tovább terjedhet, így veszélyes a még egészséges lombra, vagy a többi még nem fertőződött egyedre, ajánlatos a lehullott leveleket összegyűjteni és elégetni!

⇔**Vegyszeres védekezés:**

Permetezés szükséges, javasolt gombaölő szerek a **Kocide, Dithane, Chorus, Topas** a permetezés terjedjen ki a lehullott levelekre is, amennyiben nem semmisítettük meg azokat!

Megelőzésképp ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt olajos lemosópermetezést alkalmazni **Nevikén, Mészkenlé** és a **Vektafid** permetezőszerek valamelyike használható, a tűztövis lomblevelű örökzöld, ezért a keverék töménysége ne legyen több, mint 1,5%-os