

Igényeim:	
Fény	Árnyékos és félarányékos helyeket kedvelem igazán. A napsütötte helyeket is jól viselem.
Víz	Mezofita, azaz közepes vízigényű dísznövény vagyok, a nagy szárazságot nem jól viselem.
Hőmérséklet	A magyarországi klímát jól tűröm, a hideg telekre nem vagyok kényes, bár a késő-tavaszi fagyokra érzékeny vagyok, mivel korán indítom a hajtásaimat!
Talaj	Mély rétegű, üde, tápanyagban gazdag talajt kedvelem leginkább, de a gyengébb minőségű talajokat is elviselem.
Egyéb	Kompakt tömött gömbkorona, és gyönyörű őszi, sárga, sárgásbarna lombszín jellemző rám. A száraz, szennyezett városi levegőt rosszul viselem. Magyar nemesítésű díszfa vagyok.

Felhasználásom:

Parkfa	Kedvelt felhasználási módomban, jelentőségteljes helyeken szabályos gömbkoronám vonzó látványt nyújt. Virágot nem hozok, termést nem érlelek, ezért nem szemetelem környezetemet és pollenallergiát sem okozok.
Szoliter	Szép, gömbölyű lombkoronám, hosszú életkorom és sárga őszi lombszínem tesz egyedi díszítő értékűvé.
Utcafa	Lombkoronám nem lesz nagyobb, mint 3-4 méter átmérőjű, így a két méteres törzsemmel sem zavarom a légvezetékeket, ezért alkalmas vagyok kisebb, hegyi települések utcáinak fásítására.

Betegségeim, kártevőim

Öntözött, normál díszkerti viszonyok között, jó kondícióban vagyok, és betegségeknek, kártevőknek jól ellenálló.

Azonban nem megfelelő körülmények, azaz extrém száraz viszonyok között legyengülhetek és néhány hársfa betegség és kártevő támadhat.

**Hárs levélfoltosság
(Mycosphaerella
millegrana)**



Gomba okozta hársfa betegség. Az idősebb hársfák nem érzékenyek rá, fiatalabb példányok igen.

⇔ **Védekezés**

Ültetéskor a helyemnek megfelelő megválasztása, a kielégítő körülményeim biztosítása, kerülni kell a túl sűrű telepítést.

A fertőzött hajtásaimat vissza kell vágni, a levelekeimet lehullás után össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni.

⇔ **Vegyszeres védekezés**

Levélfoltosság elleni gombaölőszerek alkalmasak, például az **Amistar**.

**Hársfa díszbogár
(Agrilus aurocol-
lis)**



Aranyos-rezes fényű, 7 mm hosszú bogár, zöld vagy kékeszöld szárnyfedőkkel. A lombkorona csúcs- és peremrészein, az 1,0-2,5 cm átmérőjű ágak kérge alatt, 4-6 lárva, eleinte párhuzamosan

két oldalra induló, majd az ágat meggyűrűző járatot készít. A gyűrű fölötti ágrész fokozatosan elhal, a gyűrűzés helyén megvastagodik, és itt könnyen törnek az ágaim. A fertőzött ágakon lombhullás után is rajta maradnak a hervadt leveleim. Kéreg alatt készített bábkamrában bábozódik.

⇒Védekezés

A fertőzött ágak levágása és elégetése.

⇒Vegyszeres védekezés

Alkalmas lehet a **Decis 2,5 EC**, a **Mospilan 20 SP**, a **Karate 2,5 WG** vagy a **Vektafid** rovarölő szerek valamelyike, lehetőleg az inváziót észlelve azonnal szükséges permetezned, javasolt szer még az **Actara 25 WG**.

Hárslevéltetű (Eulecanium tiliae)



A leveleimet szívogatja.

⇒Védekezés

A fertőzött hajtások, levelek levágása és elégetése.

⇒Vegyszeres védekezés

Alkalmas lehet a **Decis 2,5 EC**, a **Mospilan 20 SP**, a **Karate 2,5 WG** vagy a **Vektafid** rovarölő szerek valamelyike, lehetőleg az inváziót észlelve azonnal szükséges permetezned, javasolt szer még az **Actara 25 WG**.

Mindezen betegségek és kártevők megelőzése érdekében, általános védekezéshez segítségül, ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt olajos lemosó-permetezést alkalmazni, ehhez a **Novenda**, **Nevikén**, **Mészkenlé** permetezőszerek valamelyike használható. Az olaj elzárja a károsítóktól a levegőt, miáltal azok elpusztulnak, erre az **Agrol** és a **Vektafid** szerek jöhetnek szóba.